

有害鳥獣駆除を実施します。

1. 実施日 令和7年5月7日(水)
5月8日(木)
5月19日(月)の3日間
2. 実施時間 実施日の日の出から日没までの時間
3. 実施区域 全町(市街化区域等の一部を除く)
4. 実施理由 植えて間もない稲の苗をカモ、カラスが踏み倒したり抜いてしまうので、その被害を未然に防止するため実施します。
なお、アオサギによる水稻への被害も確認されていることから、今年度より駆除対象に追加いたします。
5. 実施方法 銃器による
6. 実施主体 高根沢町農作物広域共同防除事業協議会
7. 駆除従事者 栃木県猟友会塩谷支部高根沢分会・阿久津分会

お願い事項

実施日の早朝(特に午前4時から7時まで)の外出や農作業をするときは、安全の確保にご協力くださるようお願いいたします。

■問い合わせ先／高根沢町農作物広域共同防除事業協議会
(事務局 高根沢町水田農業確立対策室) ☎676-1441

野生鳥獣に注意してください!

近年、町内でのイノシシやハクビシン等の野生鳥獣の目撃情報や農作物被害の報告が多く寄せられています。野生鳥獣に遭遇しても不用意に近づかないでください。襲ってくる場合があります。

■野生鳥獣を目撃した場合の注意事項

1. 刺激を与えない
2. 不用意に近づかない
3. エサをあげない
4. 身の安全の確保

■連絡先

◎野生鳥獣出没・目撃した場合

町産業課 農村振興係

☎ 675-8104

◎野生鳥獣による農作物被害があった場合

高根沢町農作物広域共同防除事業協議会

☎ 676-1441

ビール大麦

生育調査ほ場の状況 (R7.3.31時点)

- ・令和7年産は播種時期を遅らせたことにより(※)、出穂期は平年(4/10)よりも5日程度、前年(4/9)よりも6日程度遅くなる見込みです。

生育状況をよく観察し、赤かび病の適期防除に努めましょう!!

赤かび粒が混入すると、商品価値がなくなり搬入を拒否されます。

排水対策

排水溝の設置・修復を!

- ・根の活力維持
- ・麦の体質強化
- ・登熟向上
- ・枯れ熟れ防止

赤かび病防除

穂ぞろい後7~10日頃に薬剤防除をしましょう。

(例) トップジンMヅル

〈使用基準〉 (2025年3月26日現在)

希釈倍率	使用時期	使用回数
1500倍	収穫14日前まで	3回以内(出穂期)
8倍	収穫21日前まで	以降は1回以内)

※多発の恐れがある場合(不稔粒発生・登熟期連続降雨等)は1回目の7~10日後に1回目と異なる薬剤で2回目を散布しましょう。

田植



植付株数は
60株/坪
植付本数は
3~5本

<育苗>

- ・ハウス内の温度管理を徹底する。(30℃以上、5℃以下にはしない)。
- ・田植え前には必ずハウスを開け、苗を外気に慣らす(約1週間)。

田植え後1週間は、低温・風害から苗を守るため、水深5cm程度に!

農薬散布後の
止水期間は

7日間!

落水やかけ流しをしない!

農作業の事故に注意しましょう!

田植え等の農繁期を迎えるにあたり、乗用型機械(トラクター・田植え機等)の使用が多くなります。安全をよく確認し、事故防止に努めましょう。また、公道に泥を落としたままにすると事故の原因になりますので、田んぼから出るときは泥を落としましょう。

■お問い合わせは…JA営農経済課 ☎676-1411 または 塩谷南那須農業振興事務所 経営普及部 ☎(0287)43-2318 まで

(※) 高根沢町設置の調査ほ場播種日 令和6年産: 11/13、令和7年産: 11/19