

ワクチンの効果

		生後 90 日時点	生後 180 日時点
RS ウイルス ワクチンの効果	RS ウイルス感染による医療受診を必要とした下気道感染症の予防	6割程度の予防効果	5割程度の予防効果
	RS ウイルス感染による医療受診を必要とした重症下気道感染症(※)の予防	8割程度の予防効果	7割程度の予防効果

※医療機関への受診を要する RS ウイルス関連気道感染症を有する RS ウイルス検査陽性の乳児で、多呼吸・SpO₂ 93%未満・高流量鼻カニューラまたは人工呼吸器の装着・4 時間を超える ICU への収容・無反応・意識不明のいずれかに該当と定義しています。

ワクチンの副反応

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシーがみられることがあります。

また、ワクチン接種による妊娠高血圧症候群の発症リスクに関して、薬事承認において用いられた臨床試験では、妊娠高血圧の発症リスクは増加しませんでした。海外における一部の報告では、妊娠高血圧症候群の発症リスクが増加したという報告もあるものの、交絡因子等の影響の可能性があることから解釈に注意が必要であるとされています。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

発現割合	主な副反応
10%以上	疼痛※(40.6%)、頭痛(31.0%)、筋肉痛(26.5%)
10%未満	紅斑※、腫脹※
頻度不明	発疹、蕁麻疹

※ワクチンを接種した部位の症状

接種を受けた後の注意点

- ・ワクチンの接種後 30 分程度は安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- ・注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
- ・当日の激しい運動は控えるようにしてください。

近隣協力医療機関

県内の産科医療機関でも受けることができます。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

医療機関名	住所	電話番号
関根クリニック	光陽台 5-7-3	028-612-7015
谷口医院	宝積寺 1038	028-675-0005
さくら産院	さくら市氏家 2190-5	028-682-3000
きうち産婦人科	矢板市富田 548-1	0287-43-5600
塩谷病院	矢板市富田 77	0287-44-1155
ゆめクリニック	宇都宮市ゆいの杜 3-14-6	028-611-1881
済生会宇都宮病院	宇都宮市竹林町 911-1	028-626-5500

問合せ先 高根沢町保健センター Tel 028-675-4559
高根沢町大字宝積寺1220番地2 (図書館中央館内)